


Audit om Defensiv medicin i almen praksis



**Region Syddanmark
2019**



Kolofon: **Audit om defensiv medicin i almen praksis**

Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO)
Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense
J.B. Winsløws Vej 9A
5000 Odense C

Forfattere: Merethe Kirstine Andersen, Anders Munck og Jesper Lykkegaard

Lay-out: Susanne Døssing Berntsen

Print: Print and Sign SDU

Oplag: 100

Audit om defensiv medicin 2019

Region Syddanmark

Indholdsfortegnelse:

Indledning	4
Referencer	7
Antal registreringer per deltager	8
Alder og køn	9
Samlede resultater	10
Hyppighedsdiagrammer	14
Variationsdiagrammer på deltagerniveau	21
Aldersfordelinger	26
Registreringsskema	27
Vejledning til registreringsskema	28

Baggrund

Den medicinsk teknologiske udvikling og ændringer i opfattelsen af læge-patient-forholdet har medvirket til at skabe en række gavnlige ændringer i sundhedssektoren, både hvad angår forfinede diagnostiske procedurer og et mindre autoritativt forhold mellem læge og patient.

Ændringerne har imidlertid også medvirket til, at der mange steder i den vestlige verden efter alt at dømme praktiseres defensiv medicin som aldrig før. I USA vurderes det, at 8% af alle undersøgelser er bevidst defensive (1) og i et nyligt italiensk studie estimeres det, at defensiv medicin udgør 10% af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet (2).

I et andet amerikansk studie erkendte næsten alle deltagende praktiserende læger, at de praktiserede defensiv medicin. Blandt de mest udbredte praktikker blev blandt andet beskrevet et øget forbrug af diagnostiske tests, flere henvisninger og opfølgende konsultationer, samt overflødig detaljerede journalnotater (3).

Mange læger føler sig udsatte for sagsøgning, og selvom klager ofte drejer sig om andet end lægelige fejl eller uagtsomhed, så kan defensiv medicin måske opleves som lægens eneste mulige modtræk (4). Et nyere britisk studie fandt, at lægerne har god grund til at beskytte sig mod klagesager, idet hver sjette læge, som for nyligt havde modtaget en klage, havde symptomer svarende til moderat eller svær depression (5).

Den internationale litteratur peger således på, at defensiv medicin kan have direkte skadelige konsekvenser: 1. for patienten, idet den kan resultere i overbehandling, 2. for samfundet, idet der kan være tale om et ubegrundet forbrug af ressourcer (1, 6) samt 3. for lægen i forhold til negative psykiske implikationer. Derudover kan man frygte, at patienter, der opleves at presse lægen til en defensiv adfærd, modtager uforholdsmæssigt flere ydelser end den patient, som ikke presser lægen.

Hvorfor en audit om defensiv medicin?

Med henblik på at undersøge defensiv medicin i en dansk, almen praksis kontekst, udførte APO med støtte fra KEU Syd i 2016/2017 en kvalitativ undersøgelse af praktiserende lægers forståelse af og erfaringer med defensiv medicin. Resultaterne viste, at lægerne ud fra erfaringer med forskellige typer af pres hidrørende fra systemet, patienterne, kolleger og dem selv, forstår defensiv medicin som unødvendige og meningsløse handlinger, der kompromitterer deres faglige identitet og autonomi (7). Defensiv medicin er derfor også i en dansk primærsektor i udgangspunktet uhensigtsmæssig.

Samme studie tilvejebragte endvidere viden om, at defensiv medicin er et genkendeligt og udbredt fænomen hos praktiserende læger. Der er tale om et bredt spektrum af handlinger; fra lange journalnotater med angivelse af negative fund over simple point-of-care tests, fx CRP og halspodninger til mere ressourcetunge undersøgelser, fx henvisninger til MR-scanninger. Handlingerne motiveres primært af et systempres; dokumentation, vejledninger og forløbsbeskrivelser. Dernæst af lægernes bekymring for at overse alvorlig sygdom hos deres patienter samt frygt for klager. Udbredelsen af defensiv medicin i Dansk almen praksis har hidtil været ukendt.

Formål

A. Via en kvantitativ auditundersøgelse via APO-metoden at vurdere omfanget af defensiv medicin og de lægeoplevede motiver hertil.

B. På baggrund af resultaterne fra auditregistreringen at udvikle kvalitetsudviklingsredskaber til at justere omfanget af defensiv medicin i hensigtsmæssig retning i almen praksis i Region Syddanmark.

Materiale og metode

Den anvendte metode er audit efter APO-metoden (se figur nedenfor).
Almen praksis i Region Syddanmark deltog i projektet.

Der er, som nævnt, allerede udført et kvalitativt studie med 6 fokusgruppeinterviews med i alt 28 praktiserende læger, som har afdækket typer af defensiv medicinsk adfærd samt motiver for defensive handlinger (7). Viden indsamlet fra disse interviews dannede udgangspunkt for udarbejdelse af det anvendte APO-skema.

I det tidlige forår 2019 registrerede de deltagende praktiserende læger ALLE konsultationer over 3-5 dage. Efter hver konsultation vurderede lægen om der blev foretaget nogen defensive handlinger, hvilke, hvorfor samt i hvilken grad handlingen blev oplevet som defensiv.

Defensiv medicin er handlinger, der strider imod lægens faglighed, men som foretages på grund af krav og pres

Rapportens indhold

Rapporten beskriver det samlede resultat af alle registreringer fra almen praksis i Region Syddanmark. Der deltog i alt 31 læger fra Region Syddanmark. Lægerne registrerede i alt 2002 patientkontakter. Resultaterne præsenteres i såvel tabelform som diagrammer. Efter de samlede resultater præsenteres analyser for henvendelsesårsag, defensiv handling, etc.

I slutningen af rapporten præsenteres diagrammer, der illustrerer variationen mellem deltagerne.

Denne rapport er primært et arbejdsredskab – og ikke en videnskabelig afrapportering.

Vi håber, at den vil være et godt udgangspunkt for diskussion og opfølgning på kurserne.

Deltagerkreds og samarbejdspartnere

Merethe Kirstine Andersen, praktiserende læge, ph.d., seniorforsker, APO, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Elisabeth Assing Hvidt, mag. art. Religionssociologi, ph.d., Post Doc., Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Line Bjørnskov Pedersen, cand. Oecon, ph.d., adjunkt, COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og økonomi, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Kjeld Møller Pedersen, Professor, cand. Oecon, Institut for virksomhedsledelse og økonomi

Anders Munck, praktiserende læge, APO

Jesper Lykkegaard, praktiserende læge, ph.d., seniorforsker, APO, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Referencer

1. Chawla A, Gunderman RB. Defensive medicine: prevalence, implications, and recommendations. *Academic radiology*. 2008;15(7):948-9.
2. Panella M, Rinaldi C, Leigheb F, Knesse S, Donnarumma C, Kul S, et al. Prevalence and costs of defensive medicine: a national survey of Italian physicians. *J Health Serv Res Policy*. 2017;1355819617707224.
3. Summerton N. Positive and negative factors in defensive medicine: a questionnaire study of general practitioners. *Bmj*. 1995;310(6971):27-9.
4. Bishop TF, Federman AD, Keyhani S. Physicians' views on defensive medicine: a national survey. *Archives of internal medicine*. 2010;170(12):1081-3.
5. Bourne T, Wynants L, Peters M, Van Audenhove C, Timmerman D, Van Calster B, et al. The impact of complaints procedures on the welfare, health and clinical practise of 7926 doctors in the UK: a cross-sectional survey. *BMJ open*. 2015;5(1):e006687.
6. Hillman BJ, Goldsmith JC. The uncritical use of high-tech medical imaging. *The New England journal of medicine*. 2010;363(1):4-6.
7. Assing Hvidt E LJ, Pedersen LB, Pedersen KM, Andersen MK. . What are the understandings of and experiences with defensive medicine? Evidence from a focus group study among Danish General Practitioners. Submitted to *BMJ Open*. 2017.

Samlede resultater i tabelform


31 læger registrerede i alt 2002 konsultationer, heraf 223 konsultationer med en eller flere defensive handlinger.

		Alle n=2002		Defensive n=223	
		Antal	Procent	Antal	Procent
PATIENTENS KØN	Kvinde/pige	1194	59,6%	139	62,3%
	Mand/dreng	788	39,4%	80	35,9%
	Uoplyst	20	1,0%	4	1,8%
I alt		2002	100,0%	223	100%
KENDSKAB TIL PATIENTEN	Første konsultation	304	15,2%	33	14,8%
	Enkelte tidligere konsultationer	565	28,2%	74	33,2%
	Mange tidligere konsultationer	1037	51,8%	108	48,4%
	Uoplyst	96	4,8%	8	3,6%
I alt		2002	100,0%	223	100%
HENVENDELSSESÅRSAG	Muskel/skelet	296	14,8%	33	14,8%
	Luftveje incl. ører	350	17,5%	58	26,0%
	Urinveje, kønsorganer og graviditet	215	10,7%	24	10,8%
	Psykosocialt	209	10,4%	13	5,8%
	Hud	196	9,8%	20	9,0%
	Hjerte/kar	208	10,4%	12	5,4%
	Fordøjelse	102	5,1%	18	8,1%
	Nervesystem og øjne	74	3,7%	9	4,0%
	Endokrint/metabolisk	97	4,8%	12	5,4%
	Blod og immunsystem	25	1,2%	10	4,5%
	Andet	128	6,4%	4	1,8%
	flere henvendelsesårsager	86	4,3%	10	4,5%
	Uoplyst	16	0,8%	0	0,0%
I alt		2002	100,0%	223	100%
DEFENSIV HANDLING	Ja	223	11,1%	223	100%
	Nej	1769	88,4%		
	Uoplyst	10	0,5%		
I alt		2002	100,0%	223	100%
HVILKEN DEFENSIV HANDLING	Point-of-care-test			43	19,3%
	Blodprøver (venepunktur)			63	28,3%
	Billeddiagnostik			18	8,1%
	Medicinordination			36	16,1%
	Henvi sning			47	21,1%
	Indlæggelse			6	2,7%
	Henvi sning i pakkeforløb			3	1,3%
	Journalnotat (for langt eller for meget)			22	9,9%
	Aftale om kontrol/opfølgning			25	11,2%
	Sygemelding			3	1,3%
	Andet			6	2,7%
	Uoplyst			2	0,9%
I alt				223	122,9%
BEVÆGGRUNDE	Bekymring for at overse alvorlig sygdom			73	32,7%
	Tidligere overset alvorlig sygdom hos patienten			3	1,3%
	Bekymring for patientklage			9	4,0%
	Bekymring for at fravige klinisk retningslinje/vejledning			18	8,1%
	Påvirkning fra anden fagperson			11	4,9%
	Påvirkning fra patienten			85	38,1%
	Påvirkning fra pårørende			26	11,7%
	Patienten havde privat sundhedsforsikring			2	0,9%
	Påvirkning fra medieomtale			3	1,3%
	Tidspres			25	11,2%
	Træthed			7	3,1%
	Andet			15	6,7%
	Uoplyst			9	4,0%
I alt				223	128,3%
DIN VURDERING	I høj grad defensiv			8	3,6%
	I nogen grad defensiv			44	19,7%
	I mindre grad defensiv			150	67,3%
	Uoplyst			21	9,4%
I alt				223	100%


Antal registreringer

Øverst ses antal registreringer pr. deltagende læge, hvor også antallet af defensive handlinger fremgår. Nederst alle registreringer pr. læge fordelt på lægens kendskab til patienten.

Antal registreringer per læge




Antal registreringer per læge




Samlede resultater - alder og køn

Øverst aldersfordelingen på det samlede materiale. Nederst aldersfordelingen +/- defensiv handling. Der er relativt flest defensive handlinger for midaldrende mandlige patienter.

% Defensiv handling fordelt på alder og køn





Vurdering af defensiv handling



Samlede resultater - Defensiv handling

Samlet registreredes defensive handlinger i ialt 223 konsultationer ud af i alt 2002 konsultationer – svarende til 11% af alle konsultationer. Figurerne nedenfor illustrerer dette dels i absolutte tal, dels i %.




Samlede resultater - Kendskab til patienten


Procentvis var antallet af defensive handlinger ikke afhængig af kendskabet til patienten.

Bemærk: i den nederste figur er søjlerne med konsultationer uden defensiv handling samt de få ubesvarede ikke vist.

Kendskab til patienten



Vurdering af defensiv handling i forhold til kendskab til patienten




Samlede resultater

Der var i alt 274 defensive handlinger fordelt på 223 defensive konsultationer. I alt 36 konsultationer havde to defensive handlinger, 10 havde 3 og 5 havde 4 handlinger. Der var i alt afkrydset 286 bevæggrunde. 49 havde afkrydset 2 bevæggrunde, 12 havde 3 bevæggrunde og 2 havde 4 bevæggrunde.


Hvilken defensiv handling

n=223



Bevæggrunde


n=223




Samlede resultater - lægens vurdering

Kun knapt 4% af de defensive handlinger blev af lægen vurderet som "i høj grad", 19% i "nogen grad" mens de fleste (67%) blev vurderet som værende "i mindre grad". 88% af konsultationerne var uden nogle defensive handlinger.

Din vurdering af konsultationen



Vurdering af konsultationen i forhold til defensiv handling




Hyppigheder

Figurerne med hyppigheder viser fx, at 6,9 % af patienter med luftvejssymptomer får lavet defensive point-of-care-tests.


Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Point-of care-test (CRP, Strep-A, urin us. mm.) (n=43)




Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:


Blodprøver (venepunktur) (n=63)



Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag: Billeddiagnostik (n=18)



Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag: Medicinordination (n=36)




Hyppigheder

Den øverste figur viser eksempelvis, at 6,1% af patienter, som henvender sig med hudproblem, får en henvisning, der er defensiv.


Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Henvisning (n=47)




Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Indlæggelse (n=6)




Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Henvisning i pakkeforløb (kræft, hjerte, etc.) (n=3)




Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Journalnotat (for langt eller for meget) (n=22)




Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:

Aftale om kontrol/opfølgning (n=25)



Defensiv handling i forhold til henvendelsesårsag:


Sygemelding(n=3)




Hyppighed af bevæggrunde

Den øverste figur viser hvor hyppigt "Bekymring for at overse alvorlig sygdom" havde betydning for at lave den defensive handling i forhold til henvendelsesårsag.

Bevæggrunde i forhold til henvendelsesårsag: Bekymring for at overse alvorlig sygdom (n=73)




Bevæggrunde i forhold til henvendelsesårsag: Påvirkning fra patienten (n=85)




Hyppighed af bevæggrunde

Bevæggrunde i forhold til henvendelsesårsag: Påvirkning fra pårørende (n=26)




Bevæggrunde i forhold til henvendelsesårsag: Tidspres (n=25)




Variationsdiagrammer

Figurerne på denne side og de følgende sider viser den procentvise variation på udvalgte variable mellem de deltagende læger. Deltagerne kan finde sig selv ved det angivne deltagernummer og markere sin position med en pil. Har man få registreringer vil det være mere tilfældigt, hvor man ligger.


Point-of-care-test




Blodprøver




Medicinordination




Henvisning




Bekymring for at overse alvorlig sygdom




Bekymring for patientklage




Bekymring for at fravige klinisk retningslinje/vejledning




Påvirkning fra patienten





Påvirkning fra pårørende



Tidspres



Aldersfordeling på patienterne



Audit: Audit om defensiv medicin

Defensiv medicin er handlinger, der strider imod lægens faglighed, men som foretages på grund af krav og pres

Dato: _____

Tid på dagen Klokkeslæt I hele timer	Alder	Køn M K	Dit kendskab til pt.		Henvendelsesårsag		Defensiv handling		Defensiv handling(er)		Bewæggrund(e) (hvilke faktorer mener du havde betydning for at du lavede den defensive handling)		Din vurdering af konsultationen	
			1 X		Sæt kun 1 X		1 X		Mindst et kryds		Mindst et kryds		1 X	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

Første konsultation
 Enkelte tidligere konsultation
 Mange tidligere konsultationer
 Muskel/skelet
 Luftveje incl. ører
 Urinveje, kønsorganer og graviditet
 Psykosocialt
 Hud
 Hjerne/kar
 Fordøjelse
 Nervesystem og øjne
 Endokrint/metabolisk
 Blod og immunsystem
 Andet
 Ja – fortsæt registreringen
 Nej - **afslut registreringen** for denne pt.
 Point-of-care-test (CRP, Strep-A, urin us. mm.)
 Blodprøver (venepunktur)
 Billeddiagnostik
 Medicinordination
 Henvi sning
 Indlæggelse
 Henvi sning i pakkeforløb (kræft, hjerte, etc.)
 Journalnotat (for langt eller for meget)
 Aftale om kontrol/opfølgning
 Sygemelding
 Ingen af førnævnte
 Bekymring for at overse alvorlig sygdom
 Tidligere overset alvorlig sygdom hos patienten
 Bekymring for patientklage
 Påvirkning for at fravige klinisk retningslinje/vejledning
 Påvirkning fra anden fagperson
 Påvirkning fra patienten
 Påvirkning fra pårørende
 Patienten havde privat sundhedsforsikring
 Påvirkning fra medieomtale
 Tidspres
 Træthed
 Ingen af førnævnte
 I høj grad defensiv
 I nogen grad defensiv
 I mindre grad defensiv

Defensiv medicin i almen praksis

Vejledning til udfyldelse af auditskema

Registreringen starter så snart det er belejligt for dig efter du har modtaget materialet. Registreres i ALLE konsultationer minimum 3 dage og gerne 5. Meget gerne på forskellige ugedage.

Du bedes registrere ved alle konsultationer da vi ønsker viden om hyppigheden af defensive handlinger.

Defensiv medicin er handlinger, der strider imod lægens faglighed, men som foretages på grund af krav og pres

Der udfyldes en linje for hver patient. Vi anbefaler, at registreringen udføres umiddelbart efter konsultationen.

Dato	Der startes på et nyt skema hver dag, du skal nok bruge flere skemaer pr. dag
Tidspunkt på dagen	Skriv klokkeslæt i hele timer, fx kl. 15
Alder	Hvor gammel er patienten
Køn	Afkryds patientens køn
Dit kendskab til patienten	Sæt kun 1 X Hvor godt kender du patienten? Om du ser patienten første gang eller har set vedkommende få eller mange gange.
Henvendelsesårsag	Sæt kun 1 X Den vigtigste henvendelsesårsag, eller den henvendelsesårsag, der relaterer sig til en eventuel defensiv handling.
Indeholdt konsultationen mindst én defensiv handling?	Sæt kun 1 X <u>Hvis konsultationen ikke indeholdt nogen defensive handlinger kan du slutte her</u>
Defensiv handling(er)	Sæt mindst 1 X Her er listet en lang række muligheder hvor du må overveje om handlingen har haft defensiv karakter. Henvisning inkluderer henvisning til fysioterapi, indlæggelse/ambulant henvisning, speciallæge, psykolog mm.
Bevæggrunde	Sæt mindst 1 X Liste over faktorer der kan have betydning for at du udførte den defensive handling, fx påvirkning fra pårørende eller andre.
Din vurdering af konsultationen	Sæt kun 1 X Graden af defensiv handling

Udfyldte skemaer returneres efter endt registrering i vedlagte svarkuvert til:
Audit Projekt Odense, J.B. Winsløws Vej 9A, 1 sal 5000 Odense C
Fax: 65 91 82 96 – apo@health.sdu.dk

